

تعرفي على مخاطر الولادة القيصرية



تمثل مخاطر الولادة القيصرية خطراً أكبر فيما يتعلق بالولادة الطبيعية، حيث يمكن أن يحدث نزيف أو عدوى أو تجلط الدم أو مشاكل في التنفس لدى الطفل. لا داعي للقلق على المرأة الحامل، حيث أن المخاطر تزداد فقط، ولكن هذا لا يعني أن هذه المشاكل تحدث دائماً، حيث يتم إجراء الولادات القيصرية عادةً دون مضاعفات.

حتى كونها طريقة أكثر توغلاً ومخاطر أكبر، فإن العملية القيصرية أكثر أماناً ومبررة في بعض الحالات، مثل عندما لا يكون الطفل في الوضع الصحيح أو عندما يكون هناك انسداد في القناة المهبلية.

مخاطر الولادة القيصرية

على الرغم من أنها إجراء آمن، إلا أن العملية القيصرية تنطوي على مخاطر أكثر من الولادة الطبيعية. فيما يلي بعض المخاطر والمضاعفات التي قد تنشأ أثناء الجراحة أو بعدها:

- تطور العدوى.
- نزيف.
- تجلط الدم.
- إصابة الطفل أثناء الجراحة.
- ضعف الشفاء أو صعوبة الشفاء، خاصة عند النساء ذوات الوزن الزائد.
- تشكيل الجدر.
- صعوبات في الرضاعة الطبيعية.
- المشيمة المرفقة، وهي عندما تنضم المشيمة إلى الرحم بعد الولادة.
- المشيمة السابقة.
- التهاب بطانة الرحم.

هذه المضاعفات أكثر شيوعاً عند النساء اللواتي خضعن لولادة قيصرية أو أكثر، حيث أن تكرار الإجراء يزيد من فرص حدوث مضاعفات في مشاكل الولادة والخصوبة. تعرفي على الرعاية التي تحتاجينها للتعافي بشكل أسرع من العملية القيصرية.

مؤشرات لعملية قيصرية

على الرغم من المخاطر التي تشكلها ، لا يزال يتم تحديد العملية القيصرية في الحالات التي يكون فيها الطفل في وضعية الجلوس في رحم الأم ، عندما يكون هناك انسداد في القناة المهبلية يمنع الطفل من المغادرة ، عندما تكون هناك مشيمة منزاحة أو انفصال المشيمة ، عندما يكون الطفل يعاني أو يكون كبيراً جداً ، بأكثر من 4500 جرام ، وفي وجود أمراض معدية يمكن أن تنتقل إلى الطفل، مثل الهربس التناسلي وفيروس نقص المناعة البشرية.

يمكن إجراء هذا الإجراء أيضاً في حالة التوائم ، اعتماداً على وضع الأطفال وحالتهم الصحية ، ولهذا يجب تقييم الحالة من قبل الطبيب.

هل يمكن إجراء ولادة طبيعية بعد ولادة قيصرية؟

من الممكن إجراء ولادة طبيعية بعد الخضوع لعملية قيصرية ، لأن خطر حدوث مضاعفات منخفض عندما يتم التحكم في الولادة ومراقبتها، مما يوفر مزايا لكل من الأم والطفل. ومع ذلك ، فإن عمليتين أو أكثر من العمليات القيصرية السابقة تزيد من فرص تمزق الرحم. في هذه الحالات، يجب تجنب الولادة الطبيعية، من المهم ملاحظة أن العمليات القيصرية المتكررة تزيد من مخاطر الحمل.

اعداد

د محمد مصطفى